

Sjúkueyðkenni frá eitran av algueiturevni í skeljamati.

Skeljadjórseitran gevur nøkur ymisk eyðkenni, alt eftir hvørja eitran talan er um.

Eitranin kann deilast upp í trý høvuðssløg: Diarré-elvandi skeljadjórseitran, verður stýtt DSP (av enska heitinum: Diarrhetic Shellfish Poisoning). Lammandi skeljadjórseitran, verður stýtt PSP (av enska heitinum: Paralytic Shellfish Poisoning). Minnisloysi-elvandi skeljadjórseitran, verður stýtt ASP (av enska heitinum: Amnesic Shellfish Poisoning).

	DSP	PSP	ASP
Tilgerðartíð (Inkubatióntíð)	½ – 4 tímar	Fáar minuttir – fáir tímar	< 24 tímar > 24 tímar
Mild ella fyrstu eitranareyðkenni	Leyst lív (diarré) Spýggja Búkpína Ørilsí	Skriði og kensluloysi rundan um munnin, sum kann breiða seg til andlit og nakka. Høvuðpína Spýggja Leyst lív (diarré) Prikan í fingrunum.	Eyðkenni innan 24 tímar eru spýggja, leyst lív (diarré) og ørilsí.
Álvarslig ella seinni eitranareyðkenni	Enn er ikki ávíst, um ávirkan av DSP-eitran í longri tíð kann elva til krabba í maga- tarmskipanini.	Skaðar á nervavevnað, sum kann elva til lammelsi (paralysu). Lammilsí kann elva til brek á andingarleiðini (respirationssvigt), sum innan 2 til 24 tímar kann elva til deyða.	Eftir 24 tímar kann minnisloysi koma, og í álvarsligum tilburðum kann eitranin elva til tungt vitloysi (koma) og/ella deyða.
Longd/Tíðarskeið	Eyðkennini eru tvígongd (reversible), og ganga yvir av sær sjálvum eftir uml. 3 samdøgur, tó kunnu onkur eftirárin vera.	Við mildum eyðkennum kemur tú heilt fyri teg aftur, men ikki, um talan er um skaða á nervavevnað.	Við mildum eyðkennum kemur tú heilt fult fyri teg aftur, men ikki, um talan er um álvarslig eyðkenni.
Viðgerð	Eingin kend heilivágsviðgerð.	Andahjálpið kann bjarga persónum, sum eru álvarsliga eittraðir. Eingin kend heilivágsviðgerð.	Eingin kend heilivágsviðgerð.

Umsett úr donskum, www.fvst.dk feb.2021. Mál.nr.: 21/00601-1